VACUNA ANTIAMARILICA Y VARICELA

No	No. Registro Secretaria de Salud	No. Registro FDA	Titular	Denominación	Principio(s) Activo(s)	Producción	Concentración de Antígenos	Indicación	Forma Farmacéutica	Fabricante
1	467M97 SSA	-	GlaxoSmithKline México S.A. de C.V.	VARILRIX	Virus de varicela vivos atenuados de la cepa OKA.	Los virus vivos de varicela-zoster atenuado de la cepa OKA se obtienen por propagación en cultivos de células diploides humanas MRC5.	Virus vivos de varicela-zoster cepa OKA ≥ 2000 UFP/ 0.5 mL	Vacuna para la inmunización activa contra varicela en individuos sanos de los 9 meses de edad en adelante.	Liofilizado con ampolleta de agua inyectable con 0.7 mL para reconstituir.	GlaxoSmithKline Biologicals S.A.
2	210M98 SSA	0002	Merck Sharp and Dohme de México S.A. de C.V.	VARIVAX III	Virus vivo atenuado de la cepa Oka/Merck del virus de la varicela.	El virus se obtiene en cultivos de células diploides humanas MRC-5.	Virus vivos de varicela-zoster cepa OKA/Merck ≥ 1350 UFP/ 0.5 mL	Vacuna indicada contra la varicela para personas de 12 meses, o mayores.	Liofilizado con ampolleta de agua inyectable con 0.7 mL para reconstituir.	Merck and Co., Inc.
3	064M2000 SSA	-	Sanofi - Aventis de México S.A. de C.V.	OKAVAX	Virus de varicela-Zoster atenuado cepa Oka.	El virus de varicela-zoster es incubado y cultivado en células diploides humanas para posteriormente ser cosechado y purificado.	Virus vivos de varicela-zoster cepa OKA≥ 1000 UFP/ 0.5 mL	Esta vacuna debe aplicarse a personas mayores de 12 meses, sin antecedentes de varicela,	Liofilizado con ampolleta de agua inyectable con 0.7 mL para reconstituir.	La Fundación para la Investigación de Enfermedades Microbianas de la Universidad de Osaka (Biken).
4	337M95 SSA	-	Sanofi - Aventis de México S.A. de C.V.	STAMARIL	Virus de fiebre amarilla vivo atenuado cepa 17D.	Los virus de fiebre amarilla vivo atenuado son cultivado en embriones de pollo libres de patógenos específicos.	Virus vivos de fiebre amarilla cepa 17D > 1000 U	Para la prevención de la fiebre amarilla en adultos y niños a partir de los 6 meses de edad que vivan en o viajen a un área endémica. Se recomienda una dosis de refuerzo cada 10 años.	Liofilizado con ampolleta de agua inyectable con 0.5 mL para reconstituir.	Sanofi - Pasteur S.A.